

Erkennung und biologische Bekämpfung von Bodenschädlingen



Dickmaulrüssler

Othiorhynchus sulcatus

Grösse Circa 10 mm

Kennzeichen Dunkel gefärbt, eher nachtaktiv

Schaden Typischer buchtenartiger Frass an Blättern von eher hartlaubigen Pflanzen, Erdbeeren, Reben
Flugzeit Flugunfähig, eher nachtaktiv

Dickmaulrüssler-Larve



Grösse Bis 12 mm

Kennzeichen Die Larven sind weisslich gefärbt, besitzen eine braune Kopfkapsel. Sie sind beinlos und bauchwärts gekrümmt.

Schaden Frisst Wurzeln von Zierpflanzen, ist nicht im Rasen
Zyklus 1 Jahr

Bei Befall

Meginem® Cold (ab 8 °C Bodentemperatur, Frühling Herbst), Meginem® Pro (ab 12 °C Bodentemperatur, Frühling Herbst), ColeoStop



Gartenlaubkäfer

Phyllopertha horticola

Grösse 8–11 mm

Kennzeichen Flügeldecken braun, Halsschild metallisch-grün
Schaden Blattfrass an Stauden und niederen Sträuchern

Flugzeit Massenflug an sonnigen Vormittagen Mai–Juni

Gartenlaubkäfer-Larve



Grösse Bis 15 mm

Kennzeichen Fortbewegung auf sechs Beinen. Hat ein «Smiley» auf dem Hinterteil. Lebt meist in den Voralpen um 1000–1500 m (Golfanlagen)

Zyklus 1 Jahr

Bei Befall

Metapro (Frühling, Herbst), Phyllotrap



Junikäfer

Amphimallon solstitialis

Grösse 14–18 mm

Kennzeichen Ähnlich Maikäfer, Halsschild hellbraun. Halsschild und Flügeldecken mit dichter Behaarung.

Schaden –
Flugzeit An warmen Abenden im Juni–Juli

Junikäfer-Larve



Grösse Bis 20–35 mm

Kennzeichen Fortbewegung auf glatter Unterlage auf den sechs Beinen. Flacher «Mercedes-Stern» auf dem Hinterteil

Zyklus 2–3 Jahre



Maikäfer

Melolontha melolontha

Grösse 20–30 mm

Kennzeichen Hat an den Seiten weisse dreieckige Flecken, die Flügeldecken sind braun

Schaden Frisst Blätter von Laubbäumen, selten Früchte von Äpfeln
Flugzeit Abenddämmerung April–Mai

Maikäfer-Larve



Grösse Bis 25–35 mm

Kennzeichen Fortbewegung auf glatter Unterlage; seitlich gekrümmt
Zyklus 3–4 Jahre



Rosenkäfer

Cetonia aurata

Grösse 15–20 mm

Kennzeichen Glänzt intensiv metallisch-grün bis gold-grün
Schaden Blütenfrass, meist unbedeutend

Flugzeit Abenddämmerung Anfang Mai–August

Rosenkäfer-Larve



Grösse Bis 25–35 mm

Kennzeichen Fortbewegung auf glatter Unterlage; auf dem Rücken Schäden anrichten – meist im Kompost oder Erden mit unverrotteten Anteilen (nützlich)
Zyklus 2–3 Jahre

Bei Befall

Nicht nötig



Japankäfer

Popillia japonica

Grösse 8–12 mm

Kennzeichen Kopf und Halsschild grün, seitlich fünf weisse Haarbüschel, zwei weisse Haarbüschel am Hinterteil, arttypisches Alarmverhalten: starr verharren mit abgespreizten Beinen

Flugzeit Ende Mai–August

Japankäfer-Larve



Grösse bis 32 mm

Kennzeichen Weisslich gefärbt, besitzen eine gelblich-braunen Kopf, V-förmig angeordnete Borsten auf dem Hinterteil

Schaden Frisst Wurzeln von ca. 300 Wirtspflanzen, darunter Rasen, Rosen, Obstbäume und Weinreben
Zyklus 1 Jahr