



## Pflanzenschutz in Bio-Erdbeeren

	Vor Pflanzung	Nach Ernte / Nach Neupflanzung	Erste neue Blätter	Blütenstand-schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Ernte
<b>Schädlinge</b>							
Dickmaulrüssler		<b>Meginem Pro</b> ( <i>H. bacteriophora</i> ) September bis Oktober	Winter	<b>Meginem Pro</b> ( <i>Heterohabditis bacteriophora</i> ) März bis Ende Mai (ab 12 °C Bodentemperatur)			
Spinnmilben		<b>Amblyseius californicus</b> (Raubmilben) zur Vorbeuge in gedeckten Kulturen			<b>Phytoseiulus persimilis</b> (Raubmilben) bei ersten Spinnmilben; auch im Freiland möglich		
		<b>Natural</b> (Kaliseife) Kontaktwirkung; auch gegen Blattläuse				1 Woche →	
Thrips		<b>Spintor</b> (Spinosad)				3 Tage →	
Thrips / Weichhautmilbe		<b>Amblyseius cucumeris</b> oder ab Juni <b>Amblyseius swirskii</b> ; <b>Orius-Raubwanzen</b> zur Vorbeuge in gedeckten Kulturen					
Blattläuse				<b>Pyrethrum FS</b> (Pyrethrin)		3 Wochen →	
				<b>FresaProtect</b> (Schlupfwespen) in gedeckten Kulturen			
Schnecken		<b>Sluxx HP</b> (Eisen-III-Phosphat)					
Bestäubung					<b>Hummeln</b> ( <i>Bombus Premium</i> )		
Bodenaktivierung / Pflanzenstärkung		<b>Trianum-P WDG</b> ( <i>Trichoderma harzianum</i> )		Angiessen nach der Pflanzung als Pflanzenstärkung			
		<b>RhizoVital 42</b>		Jungpflanzen tauchen; Ertragssteigerung in von Phytophthora und Verticillium befallenen Flächen			
<b>Krankheiten</b>							
Blattfleckenkrankheit		<b>Kocide 2000</b> (Kupfer)			Keine Anwendung nach Blühbeginn →		
Echter Mehltau				<b>Vitisan</b> (Kalium-Bicarbonat)		3 Tage →	
				<b>Netzschwefel Stulln WG</b>	Keine Anwendung nach Blühbeginn →		

